

Abscessdränage

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Görs vid abscessbildning, oftast i buken, om patienten inte svarar på vanlig behandling.

Abscessen lokaliseras med hjälp av ultraljud och i lokalbedövning inläggs ett drän som kvarlämnas i abscesshålan. Dränläget verifieras ibland med kontrastmedel.

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje om [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#).

Förberedelser

1. PK och TPK om patient är blödningsbenägen.
2. PVK.
3. Fasta 4 timmar.
4. Premedicinering ordineras av PAL.
5. Röntgenjournal med patienten till röntgen.

Eftervård

1. Puls och blodtryck kontrolleras vid behov.
2. Vid ev. komplikation tillkallas PAL.
3. Abscessdränage behöver oftast spolas både frekvent och rikligt med NaCl.

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Årlig uppdatering utan ändring.

2020-02-06: TPK

2019-11-28: Lagt till Fasta 4 timmar.

2017-11-22: Ändrat vid antikoagulantia

2017-11-21: Ersatt exempel på antikoagulantia med i tablettform.