

Biopsi HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Med ultraljud, CT eller genomlysning lokaliserar förändringen och provtagningsnålen förs in i förändringen varefter ett antal prov tas, antingen med fin nål, 0,9 mm, eller mellannål, 1,2 mm.

Vid yttlig mellannålsbiopsi samt fin nålsbiopsi av t.ex. tyreoida, knäveck och yttliga tumörer behövs inga förberedelser och inte heller någon särskild eftervård.

Även benbiopsi kan göras och då borrar oftast en vävnadskolv ut ur förändringen. Förberedelser och eftervård bestäms utifrån lokal av den röntgenläkare som ska utföra biopsin.

För övriga biopsier, se nedanstående förberedelser. Se separat vårdriktlinje om [Njurbiopsi Röntgen Vbg](#)

Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar.
2. PK och TPK om patient är blödningsbenägen.
3. Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#). **Om patienten inte behandlas med antikoagulantia behövs ej blödningsprover.**
4. PVK.
5. Premedicinering. Ordinerar av PAL.
6. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

Eftervård

1. Sängläge och fasta i 2 timmar.
2. Puls, blodtryck och bukstatus kontrolleras vid behov.
3. Vid komplikation tillkallas PAL.

Uppdaterat från föregående version

2023-10-24: Årlig uppdatering. Lagt till att patienter som inte behandlas med antikoagulantia ej behöver ta blödningsprover.

2022-09-06: Årlig genomgång utan ändring.

2020-02-06: TPK

2017-11-21: Ersatt antikoagulantialäkemedel med ordet antikoagulantia.

Tillagt kommentar om förberedelser och eftervård för benbiopsi samt ändrat ordningen.

