

## Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner

Röntgenkliniken

### Hitta i dokumentet

[Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

### Röntgensjuksköterska kontaktar dagjour / jourhavande radiolog.

<b>"Lätta" reaktioner</b>	Värmekänsla, illamående, kräkning, enstaka urticariella utslag	Lugnt omhändertagande, säkra i.v nål. Noggrann observation 30 min alternativt transport till akutmottagning
<b>Måttlig-svår reaktion</b> Allmänpåverkan, blodtrycksfall, andningsbesvär, kraftig urtikaria, kraftiga buksmärtor och kräkningar.	<b>Bedöm och behandla patienten enligt behandlingsschema nedan (följ BT, puls, andning/saturation, medvetandegrad)</b>	<b>Kalla in mer personal!</b> Akutväska, andningsmask, defibrillator, pulsoximeter Narkoslarm 3000 Hjärtlarm 2000 (vid hjärtstopp)
<b>Dokumentera</b>	<b>Tidpunkt och dos/styrka för givna läkemedel</b>	<b><a href="#">Dokumentationsblankett kontrastreaktion Röntgen Halmstad Sjukhus</a> finns på akutvagnen alt på intranätet för utskrift, pappersjournal följer med patienten till akutmottagning/vårdavdelning</b>

### [Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner](#)

## Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad version 2023-10-19. Genomgången av Malin Holmgren överläkare