

Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner

Röntgenkliniken

Hitta i dokumentet

[Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Röntgensjuksköterska kontaktar dagjour / jourhavande radiolog.

"Lätta" reaktioner	Värmekänsla, illamående, kräkning, enstaka urticariella utslag	Lugnt omhändertagande, säkra i.v nål. Noggrann observation 30 min alternativt transport till akutmottagning
Måttlig-svår reaktion Allmänpåverkan, blodtrycksfall, andningsbesvär, kraftig urtikaria, kraftiga buksmärter och kräkningar.	Bedöm och behandla patienten enligt behandlingsschema nedan (följ BT, puls, andning/saturation, medvetandegrad)	Kalla in mer personal! Akutväska, andningsmask, defibrillator, pulsoximeter Narkoslarm 23000 Hjärtlarm 2000 (vid hjärtstopp)
Dokumentera	Tidpunkt och dos/styrka för givna läkemedel	Dokumentationsblankett kontrastreaktion Röntgen Halmstad Sjukhus finns på akutvagnen alt på intranätet för utskrift, pappersjournal följer med patienten till akutmottagning/vårdavdelning

[Åtgärder vid kontrastmedelsutlösta reaktioner](#)

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterat larmnummer från 3000 till **23000 gäller fr o m 20240923**..Uppdaterad version 2023-10-19. Genomgången av Malin Holmgren överläkare