

# CT angiografi Röntgen Vbg

---

## Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)  
[Förberedelser](#)  
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Allmänt om undersökningen

Kontrastmedelsundersökning av artär, t.ex. halskärl, njurartärer eller kärl i bäcken och ben. Till skillnad från konventionell angiografi krävs inget stick i artären, utan kontrasten ges intravenöst vilket innebär mindre obehag för patienten och ingen eftervård. Denna undersökningsteknik lämpar sig väl vid kartläggning av patientens artärer. För ballongvidgning och stentinfläggning krävs dock konventionell angiografi.

Det krävs en hög injektionshastighet av kontrasten och detta kräver en grov nål. En vit eller grön PVK sätts i ett bra kärl. Beakta ev. kontrastmedelsallergier.

Undersökningen medför inget eller ringa obehag för patienten som dock måste kunna ligga stilla och hålla andan på uppmaning under bildtagningen.

## Förberedelser

1. PVK
  - a. **Inneliggande patienter:** PVK sätts på vårdavdelning, vit eller grön, helst i höger armveck
  - b. **Polikliniska patienter:** PVK sätts på Röntgenmottagningen.
2. Färskt kreatinin ska finnas angivet på remissen.
3. Behandlas patienten med Metformin, se separat Vårdriktlinje [Kreatinin, kriterier vid jodkontrastundersökningar.docx](#)

## Eftervård

Riklig dryck vid intravenös kontrast, alternativt intravenös vätska.

### Uppdaterat från föregående version

2023-08-23: Årlig uppdatering utan ändring.  
2021-11-03: Tagit bort info om kontrast.  
2019-10-30: Årlig uppdatering. Adm ändringar.  
2017-11-06: Reviderad utan ändring