

CT Kolon Röntgen Varberg

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Dietföreskrifter](#)
[Laxeringsföreskrifter](#)
[Förberedelser](#)

[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

CT kolon ersätter ofta konventionell tjocktarmsröntgen. Förberedelserna innebär dels laxering för att tarmen ska vara tom och dels att patienten dricker ett kontrastmedel dagarna innan undersökningen. Vid undersökningen ges också intravenöst kontrastmedel. Beakta eventuella kontrastmedelsallergier.

Läs mer om kontrastmedel här <https://www.sfmr.se/sidor/kontrastmedel/>

Dietföreskrifter

För att undersökningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att patienten följer dessa förberedelser.

3 dagar före undersökning

Undvik mat som innehåller mycket fibrer, t.ex. grönsaker, frukt, bär, fiberrikt bröd och müsli.

Kontrastmedelslösning att dricka

E-Z CAT är en vätska innehållande bariumkontrastmedel. Den märker eller "färgar" eventuellt kvarvarande innehåll i tjocktarmen så att innehållet kan urskiljas från eventuella slemhinneförändringar. E-Z CAT är således inget laxermedel och påverkar inte tarmtömningen. Förvara E-Z CAT i rumstemperatur.

E-Z CAT ska drickas i portioner enligt anvisning nedan.

2 dagar före undersökningen

Blanda två flaskor E-Z CAT i 5,5 dl vatten. Total mängd blir 1 liter vätska. **OBS! Rör om ordentligt innan varje portion tas.**

Undvik mat som innehåller mycket fibrer, t.ex. grönsaker, frukt, bär, fiberrikt bröd och müsli. Se anvisning nedan angående kontrastmedelslösning att dricka.

I samband med lunch	Drick 2 dl av E-Z CAT, rör om blandningen innan.
I samband med middag	Drick 2 dl av E-Z CAT, rör om blandningen innan.

Laxeringsföreskrifter

Syftet med laxeringen är att få tarmen helt ren före undersökningen. Följ därför anvisningarna i denna informationstext som ersätter de anvisningar som ligger i Movprep-förpackningen. Movprep framkallar tarmtömningar. Patienten bör ha en toalett i närheten när laxeringen startar.

Movprep består av två förpackningar som vardera innehåller två påsar. En stor påse som benämns A och en liten påse som benämns B. Lösningen smakar citrus och dricks med fördel kall. Eventuellt kan man blanda i lite saft för smakens skull.

Dagen före undersökningen

Dagen före undersökningen får patienten äta en lätt frukost, härefter bör rikligt med klar dryck intas. Med klar dryck menas vatten, sportdryck, buljong (innehåller salt), juice utan fruktkött, saft, svart kaffe och te.

Kl. 07.00	Två skivor vitt bröd, ost, marmelad utan skal. Klar dryck. Drick 2 dl av E-Z CAT, rör om blandningen innan.
Kl. 08.00	Blanda Movprep, nr 1 från en förpackning. Häll påse A och B i en stor bringare som rymmer mer än 1 liter. Tillsätt 1 liter kallt vatten och vispa ordentligt i cirka 5 minuter. Ställ kallt.
Kl. 12.00	Drick 2 dl av E-Z CAT, rör om blandningen innan. Drick 1 liter Movprep fördelat på 1-2 timmar. Drick även klara drycker, minst 2,5 dl/timma fram till kl. 18.00.
Kl. 14.00	Blanda Movprep, nr 2 från en förpackning. Häll påse A och B i en stor bringare som rymmer mer än 1 liter. Tillsätt 1 liter kallt vatten och vispa ordentligt i cirka 5 minuter. Ställ kallt.
Kl. 16.00	Drick 2 dl av E-Z CAT, rör om blandningen innan.
Kl. 18.00	Drick 1 liter av Movprep fördelat på 1-2 timmar. Drick även klar dryck fram till midnatt.

Undersökningsdagen

Patienten ska vara fastande, men får lov att dricka 2 dl klar dryck på morgonen om så önskas. Ta eventuella mediciner.

Senast 2 timmar före undersökningen ska patienten ta 1 Toilax klysma enligt anvisning på förpackningen.

Förberedelser

Inneliggande patienter

1. Grön PVK sätts i valfritt armveck.
2. Färskt kreatinin ska finnas angivet på remissen.
3. Behandlas patienten med Metformin, se <https://www.sfmr.se/sidor/kontrastmedel/>

Polikliniska patienter

1. Får PVK på Röntgenmottagningen.
2. Färskt kreatinin ska vara angivet på remissen.
3. Behandlas patienten med Metformin, se <https://www.sfmr.se/sidor/kontrastmedel/>
4. Föreskrifter skickas hem till patienten, E-Z CAT får hämtas av patient eller ombud på röntgenmottagning.

Patienten får komma till Röntgenmottagningen två timmar innan undersökningens början för att dricka ½ liter vatten med 12 ml Gastrografin.

Eftervård

Riklig dryck vid intravenös kontrast, alternativt intravenös vätska.

Uppdaterat från föregående version

2023-06-02: Årlig uppdatering utan ändring.

2022-05-24: Lagt till länk för kontrastinformation.

2022-05-04: Adm ändring.

2022-02-02: E-Z CAT ersätter READI-CAT 2.

2019-10-30: READI-CAT 2. Adm ändringar.

2017-11-08: Lagt till att pat kommer till rgt 2 timmar före undersökning.