

# Antibiotika (I) och antiseptika (II) i samband med implantatbehandling

---

## Hitta i dokumentet

[1. Friska patienter utan någon komplicerande anamnes:](#)

[2. Riskpatienter](#)

---

## Antibiotika och antiseptika i samband med implantatbehandling

|

### 1. Friska patienter utan någon komplicerande anamnes:

Efter individuell bedömning kan vid behov antibiotika ordineras.

T. Amoxicillin, 2g före operation

Vid penicillinallergi: K. Dalacin, 600 mg före operation

### 2. Riskpatienter

Recept: T. penicillin-V 1,6gx3 i 7 dagar att påbörjas dagen innan operation.

Vid penicillinallergi: Recept: K. Dalacin 300 mgx3 i 7 dagar att påbörjas dagen innan operation.

### Riskpatienter:

Immunologiskt nedsatt patient

Patient med strålbehandlad käke

Patient med metabol sjukdom t.ex. avancerad diabetes

Patient med njursjukdom

Storrökare

Ben-transplantation

Sinus-lift

Split-crest

Behandling med membran

Behandling med titannät

Individuell bedömning av ytterligare tillstånd

## II

Klorhexidinsköljning, Hexident 1 mg/ml, 10 ml x 2, med start ett par dagar före operation och fram till suturtagning.

Corsodyl munhålegel 1 % på mjuk tandborste efter suturtagning under 2 veckor.