

CT – kontrast vid datortomografi Röntgen Vbg

Hitta i dokumentet

[Peroral kontrast](#)
[Intravenös kontrast](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Peroral kontrast

Vanliga bukar dricker 1 l vatten under 1,5 timme före undersökning vid ordination.

Njurar, lever, pankreas: dricker 0,5 l vatten under 30 minuter före undersökning vid ordination.

Undantag: Vid frågeställning abscess, appendicit, perforation eller fistel ska patienten vid ordination dricka jodkontrastblandning:

20 ml Gastrografin eller 20 ml Omnipaque 350 mg i/ml blandat i 1,5 l vatten under 2 timmar före undersökning, ev. 20 ml Omnipaque 240 mg i/ml blandat med 1 l vatten under 1-2 timmar före undersökning.

Polikliniska patienter får en förpackning E-Z CAT.

Vid alla bukundersökningar är det bra om patienten dricker ett glas vatten innan undersökningen startar.

Intravenös kontrast

Omnipaque 350 mg i/ml används vid alla CT-undersökningar – finns i 500 ml flaskor, 200 ml flaskor och 100 ml flaskor.

Individuell dos eller fast dos enligt CT-protokoll.

Barn: 1,3 ml Omnipaque 350 mg i/ml/kg kroppsvikt.

Uppdaterat från föregående version

2023-06-20: Årlig uppdatering utan ändring.

2022-06-08: Ändrat mängden vatten vid peroral kontrast.

Ersatt READI-CAT 2 med E-Z CAT.