

Datortomografi Lever

Röntgen Halmstad Sjukhus

Hitta i dokumentet

[Allmänt](#)
[Patientförberedelser](#)

Allmänt

Vanligaste indikationen är att avgöra om metastaser föreligger.

Andra indikationer är tumörbedömning i lever eller gallvägar, ibland efter att ultraljud visat sjukliga förändringar.

Undersökningen förekommer vidare vid misstanke om abscess i levern och vid diffus leverparenkymsjukdom samt vid andra ovanligare frågeställningar.

Beroende på frågeställning utförs undersökningen med eller utan intravenös kontrast. Vid frågeställning "hemangiom" görs i första hand ultraljud med kontrast.

Patientförberedelser

Ingen laxering. Ingen fasta. Ingen peroral kontrast (om endast levern undersöks).

För **inneliggande patienter** som ska undersökas med intravenös kontrast ska intravenös nål sättas på vårdavdelning. I dessa fall meddelas vårdavdelningen av röntgenpersonalen.

När **polikliniska patienter** ska undersökas med intravenös kontrast sätts nål på röntgenavdelningen.

Remissen ska innehålla uppgift om kontrastallergi föreligger eller ej samt aktuellt kreatinivärde.

Uppdaterad 2021-09-21 – ingen ändring