

# Dubbelpigtailkateter eller uretärstent av metall

## Hitta i dokumentet

[Allmänt](#)  
[Förberedelser](#)  
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

## Allmänt

En dubbelpigtail är en kateter med en förformad kringla i båda ändarna. Den här typen av kateter används när det finns ett avflödeshinder i uretärerna. Vanligtvis orsakas hindret av någon form av canceröverväxt från t.ex. urinblåsan eller tarmpaketet. Ibland skadas uretärerna vid operationer i buken och då kan det bli aktuellt med en dubbelpigtailkateter. Alternativt läggs ett metallstent, ett nät av metall, genom hindret.

Katetern/stentet läggs vanligtvis in via en redan inlagd pyelostomikateter. Läget verifieras med kontrastmedel.

Eftersom detta ingrepp kan vara smärtsamt, hjälper narkospersonal ibland till med sedering och smärtstillning av patienten. Denna bedömning görs av ansvarig radiolog från fall till fall.

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling inför röntgenundersökning](#).

## Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar
2. PVK
3. Premedicinering ordineras av PAL
4. KAD ska vara satt på avdelningen innan patienten kommer till röntgen
5. KAD:n skall vara stängd ½ timma före ingreppet för att blåsan ska hinna fylla sig
6. Profylaktisk antibiotikabehandling som infusion alternativt engångsdos iv. 30 minuter före undersökningen. Ordinerar av PAL

## Eftervård

1. Puls, blodtryck och urinens färg kontrolleras vid behov
2. Vid ev. komplikation tillkallas PAL

## Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Information om kontrastmedel borttaget.

2020-02-06: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-22: Tagit bort exempel på antikoagulantia.