

# Dubbelpigtailkateter uretärstent metodbeskrivning

## Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)  
[Steril uppdukning](#)  
[Läkemedel](#)  
[Tillvägagångssätt](#)

[Eftervård](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

## Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar
2. PVK
3. Premedicinering ordinerar av PAL
4. KAD ska vara satt på avdelning innan patienten kommer till Röntgen
5. KAD:n ska vara stängd en halvtimme före ingreppet för att blåsan ska hinna fylla sig
6. Profylaktisk antibiotikabehandling som infusion alternativt engångsdos iv. 30 minuter före undersökningen. Ordinerar av PAL.

## Steril uppdukning

Se uppdukningspärmen i sterilrummet.

## Läkemedel

Klorhexidinsprit  
Carbocain 10 mg/ml  
NaCl  
Omnipaque 240 mgl/ml

## Tillvägagångssätt

Patienten i bukläge med aktuell sida upp vriden, eventuellt rakt på sidan.

Descutantvätt

Steriltvätt

Stentet läggs in med hjälp av en ledare via en tidigare inlagd P-kateter. När stentet är på plats läggs eventuellt en kateter in som ska hållas stängd. Via denna kan man kontrollera dubbelpigtailkatetern efter 1-2 dagar.

## Eftervård

1. Puls, blodtryck och urinens färg kontrolleras vid behov
2. Vid ev. komplikation tillkallas PAL

## Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Årlig uppdatering utan ändring.

2020-02-17: Kateter som ev. läggs in för kontroll ska hållas stängd.

2017-11-22: Ersatt förberedelser och eftervård med text istället för länk till annan vårdriktlinje.

