

## Gällande radiologi och utredning av arteriell insufficiens i benen

---

### Hitta i dokumentet

[Arteriell insufficiens i benen](#)  
[Bildframställan med CT, MR eller ultraljud](#)  
[I Halland](#)

[Remisser](#)  
[Uppdaterat 2021-05-04](#)

---

*Detta dokument har upprättats i syfte att begränsa onödig bildagnostik både för att hushålla med resurser och för att bespara patienter onödig bestrålning*

### Arteriell insufficiens i benen

Arteriell insufficiens i benen drabbar i huvudsak, rökare, diabetiker och äldre patienter. Kliniken är gångrelaterade smärtor (claudicatio), vilovärk, sår som inte läker eller gangrän. Diagnosen är helt klinisk och ställs med en god anamnes och bekräftas med ett kliniskt status.

### Bildframställan med CT, MR eller ultraljud

Bildframställan med CT, MR eller ultraljud kan påvisa lesioner men kan inte urskilja symtomatiska från asymtomatiska. Det är därför inte rationellt att göra radiologi innan det fattats beslut om att gå vidare med ett kärlingrepp.

### I Halland

I Halland bedöms patienter med tecken på nedsatt cirkulation i benen på kärlmottagningen där kärlkirurgen gör ett ultraljud. Vid beslut om aktiv behandling sker detta på ett interventionslab där kärlkirurgen utför någon form av endovaskulärt ingrepp (ballongvidgning). I enstaka fall krävs det en kartläggning med CT eller MR inför ett ingrepp men det initieras i så fall av operatören.

### Remisser

Remisser för bildframställan med frågeställningen arteriell insufficiens i benen som inte kommer från kärlkirurg bör därför returneras och istället hänvisas till kärlkirurgen, Hallands Sjukhus Halmstad.

Halmstad 21-04-28

Peter Danielsson Öl, ansvarig för kärilverksamheten i Halland

Lennart Müller

Uppdaterat 2021-05-04