

Gastrostomi/Mic-Key knappinläggning

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Metod som tillåter enteral nutrition hos patienter som inte kan försörja sig per os och där parenteral nutrition respektive vanlig sondmatning inte är aktuell.

I genomlysning lokaliserar ventrikeln genom att den fylls med luft genom ventrikelsonden.

I lokalbedövning fästs ventrikelns vägg upp mot bukväggen och fixeras med 4 upplösbara hållsuturer. Därefter görs ett hål genom huden in i ventrikeln genom vilket en matningskateter/"knapp" läggs in som fixeras och kan användas för matning när patienten kommer till vårdavdelningen.

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje om [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#).

Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar.
2. Ventrikelsond.
3. PVK.
4. Premedicinering ordineras av ansvarig läkare.
5. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

Eftervård

1. Endast vatten i knappen första dygnet.
2. Mat i sonden – enligt patientens nutritionsplan eller enligt vårdriktlinje [Nutrition – parenteral, vuxna](#).
3. Behov av eftervård bedöms av ansvarig läkare.

Uppdaterat från föregående version

2023-11-20: Uppdaterat länk till vårdriktlinje "Nutrition - parenteral".

2020-12-29: Lagt till "Endast vatten i knappen första dygnet". (Eftervård)

2020-02-06: Tagit bort "endast vatten i knappen första dygnet"

2017-12-05: Ändrat Eftervård, punkt 2 till patientens nutritionsplan eller VL Nutrition – enteral vuxna.

2017-11-22: Ersatt exempel på antikoagulantia med ordet antikoagulantia.

Eftervård. Endast vatten första dygnet.