

Injektion i höftled/axelled metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Steril uppdukning](#)
[Läkemedel](#)
[Tillvägagångssätt](#)

[Efter injektionen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Steril uppdukning

Litet set
10 ml spruta till kontrast
Mellanstycke
Höftblockadsnål (svart)
Sterilt plastskydd

Läkemedel

Klorhexidinsprit
Omnipaque 240 mg/ml
Depo-Medrol 40 mg/ml
Carbocain 10 mg/ml

Tillvägagångssätt

Sprittvätta och klä med sterila dukar
Koppla ihop nål – mellanstycke – kontrast och spola igenom
Läkaren punkterar leden och sprutar kontrast för att verifiera läget i leden.
Vid rätt läge injiceras 2 ml Depo-Medrol + 3 ml Carbocain eller den mängd remittenten
alternativt röntgenläkaren önskar.

Efter injektionen

Patienten ska efteråt notera skillnader i smärta och rörelseförmåga jämfört med före injektionen.

Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Ändrat innehåll under Steril uppdukning.
2020-02-06: Årlig uppdatering utan ändring.
2017-11-21: Tagit bort;"Trochanterithöfter" får 1 ml Depo-Medrol cum lidocain.