

Intraartikulära injektioner HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt

Görs vid oklara smärttillstånd där remitterande läkare vill ta reda på om patientens besvär kommer från t.ex. höftleden. Med hjälp av genomlysning punkteras den aktuella leden med en tunn nål och en liten mängd kontrastmedel sprutas in för att verifiera det intraartikulära läget.

När röntgenläkaren har säkerställt att nålen ligger i leden injiceras en liten mängd lokalbedövning och ibland även kortison.

Efter undersökningen/behandlingen ska patienten rapportera till sin läkare om smärtorna ändrat karaktär eller försvunnit.

Förberedelser

För axlar och höfter: Behandlas patienten med antikoagulantia, se vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling vi röntgenundersökning](#).

För övriga leder: inga förberedelser.

Eftervård

Ingen eftervård krävs.

Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Information om kontaktmedel borttaget.

2020-02-06: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-28: Korrigerat ytterligare om antikoagulantibehandling.

2017-11-21: Korrigerat – i tablettform istället för exempel på läkemedel vid antikoagulantia.
Första version. Korrigerat vid annan antikoagulantia.