

## Kontrastblandningar metodbeskrivning

### Hitta i dokumentet

[Kontrastblandningar vuxna](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

### Kontrastblandningar vuxna

	Kontrast	Vatten
Hypofarynx Esofagus Ventrikel  Akut esofagus	1 burk E-Z HD	65 ml kallt vatten
Akut esofagus – främmande kropp?	Vattenlöslig kontrast enligt läkarordination	

**OBS!** Vid blandning av E-Z HD – slå burken upp och ned mot en kant så att pulvret som sitter i botten löses upp.

Tunntarmspassage akut	Kontrast	
V-sond	100 ml Gastrografin utspädd i sonden, administreras på resp. avdelning	

Kolon	Kontrast	Vatten
Dubbelkolon	2 burkar E-Z HD	9 dl vatten 37°
Akut kolon enkel	1 burk E-Z HD	10 dl vatten 37°
Volvulus	1 burk E-Z HD	10 dl vatten 37°

Sväljundersökning med logoped	Tjock kontrast	Tunn kontrast	Kex	Vattenlöslig
-------------------------------	----------------	---------------	-----	--------------

	<p>Först 1 skopa Thicken-up. Häll över 2 msk vatten eller saft, ska svälla en stund. Blanda sedan i 1 msk E-Z HD.</p> <p>Tjock kontrast vattenlöslig – först 1 skopa Thicken-up. Häll sedan över 2 msk Visipaque 270 mg/ml.</p>	<p>1 burk E-Z HD blandas med 65 ml kallt vatten</p>	<p>Mariekek med tjock kontrast</p>	<p>Visipaque 270 mg/ml + mineralvatten, blanda 50/50</p>
--	---	---	------------------------------------	--

#### Uppdaterat från föregående version

2023-10-05: Årlig uppdatering. Lagt till kolumn "Vattenlöslig" på Sväljundersökning med logoped.

2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-12-04: Lagt till tjock kontrast vattenlöslig.

Ersatt Mixobar med E-Z HD. Tagit bort riktlinjer för enterografi med sond, kontrastblandningar barn och pylorusstenos.