

Läkemedel Röntgenmottagningen Vbg. Ordination enligt generella direktiv

Hitta i dokumentet

[Generell delegering](#)
[Läkemedel](#)
[Vuxendos](#)
[Indikation](#)

[Anmärkning](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Generell delegering

Läkemedel	Vuxendos	Indikation	Anmärkning
Buscopan 20 mg/ml	20-40 mg im. eller iv.	I samband med CT kolon samt inför MR-us	Efter prioriterad remiss
Dotarem 279,3 mg/ml	Enligt MR-protokoll	MR-us	Efter prioriterad remiss
Emla kräm Emla plåster	Stryks på aktuell hudyta cirka 30 min innan ingrepp	Ytanestesi vid injektion	Ej till barn under 3 mån. Ej heller till barn som har methenoglobin-inducerande LM
Gadovist 1.0 mmol/ml	0,2 ml/kg kroppsvikt	MR-us av hjärtat	Efter prioriterad remiss
Jext 150 µg alt. Epipen 150 µg Adrenalin inj-penna	Till barn : 1 engångsdos im. enl. protokoll Anafylaktiska reaktioner	Måttlig överkänslighetsreaktion på kontrastmedel	Injektion ska endast ges på utsidan låret
Jext 300 µg alt. Epipen 300 µg Adrenalin inj-penna	Till vuxen: 1 engångsdos im. enl. protokoll Anafylaktiska reaktioner	Måttlig överkänslighetsreaktion på kontrastmedel	Injektion ska endast ges på utsidan låret
Prim.ovist 0,25 mmol/ml	Enligt MR-protokoll	MR lever	Efter prioriterad remiss
Microlax rektallösning	Enligt MR-protokoll	MR-us	
Diazepam 5 mg/ml	2,5-5,0 mg iv.	MR-us	Till patient med klaustrofobi. Efter prioriterad remiss. Reaktionsförmågan kan nedsättas. Får ej köra bil på 24h efter

			inj.
--	--	--	------

Valium 10 mg/2 ml	2,5-5,0 mg iv.	MR-us	Till patient med klaustrofobi. Efter prioriterad remiss. Reaktionsförmågan kan nedsättas. Får ej köra bil på 24h efter inj.
Syrgas O2	2 l på grimma alt. minst 5 l på mask	Andningsbesvär, bröstsmärtor eller illamående	Kontraindikation: obstruktiv lungsjukdom
T Ibumetin 400 mg	1 tabl. 1-3 ggr/dygn	Huvudvärk	
T Alvedon 500 mg	1-2 tabl.1-4 ggr/dygn	Huvudvärk	
T Saliv.in	1 sugtabl. vid behov	Vid muntorrhet i samband med röntgen-us	
T Treo	1-2 Brustabl. 1-3 ggr/dygn	Huvudvärk	Ej till astmapat, pat. med aktivt ulcus eller allergi mot acetylsalicylsyra
Omnipaque 240 alt. 350 mg l/ml.	Enligt CT-protokoll	CT-us	Efter prioriterad remiss
Glucagon 1 mg/ml	0,5 mg iv. el im., ev..i upprepede doser	MR-us	Efter prioriterad remiss

Uppdaterat från föregående version

2022-08-05: Tagit bort Minifom emulsion, ersatt Stesolid med Valium.

2020-10-29: Lagt till Diazepam

2019-05-24: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-12-04: Tagit bort Heparin 100 IE/ml

Gadovist 0,2 ml/kg kroppsvikt ist för att dos räknas ut efter pats vikt. Ändrat T Panodil till T Alvedon