

Lungbiopsi HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Görs oftast CT-väglett men kan även göras i genomlysning. Förändringen som ska biopsieras identifieras och i lokalbedövning görs en finnålsbiopsi med en 0,9 mm tjock nål eller en mellannålsbiopsi med en 1,2 mm tjock nål.

Till följd av ingreppets karaktär är pneumothorax en vanlig komplikation.

Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar.
2. PK och TPK
3. PVK
4. Premedicinering ordinerar av ansvarig läkare.
5. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

Eftervård

1. Sängläge och fasta i 2 timmar.
2. Puls och blodtryck kontrolleras vid behov.
3. Lungröntgen görs 2 timmar efter undersökningen. Ny remiss krävs för detta.
4. Vid ev. komplikation tillkallas ansvarig läkare.

Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Årlig uppdatering utan ändring.

2020-02-17: TPK

2017-11-28: Tagit bort information ang. att prov tas för att skickas för analys.

Första version