

Mammografi, indikering Röntgen Halmstad

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Patientförberedelser](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Icke-palpabla förändringar som ska opereras bort kan ibland behöva märkas ut. Detta görs genom att en ståltråd eller radiojodkorn sätts in i förändringen. Tråden eller jodkornet placeras oftast med vägledning av ultraljud eller stereotaxi. Vid operationen följer man tråden eller detekterar jodkornet med ett mätinstrument och kan på så sätt finna förändringen. Tråden eller jodkornet är tunn och obehaget vid ingreppet motsvarar en vanlig fin nålpunktion.

Patienten får lokalbedövning oavsett vilken metod som används.

Mammografi-och/eller ultraljudsbilder tas för att dokumentera läget.

Trådindikeringen görs på operationsdagen.

Radiojodkornsindikeringen kan göras några dagar alternativt veckor innan den planerade operationen.

Radiojodkorn används för indikering av icke palpabla brösttumörer och vid indikering av sjuka lymfkörtlar i armhålan inför neoadjuvant behandling med TAD ("Targeted Axillary Dissection") och sitter kvar tills patienten opererats, dvs i upp till fem månader.

Patientförberedelser

Inga förberedelser.

Uppdaterat från föregående version

2021-08-31

2025-03-18 Årlig uppdatering. Justering gällande rutin vid undersökning