

# Meckels Divertikelscintigrafi

---

## Hitta i dokumentet

[Tillämpningsområde: Röntgen Halmstad Sjukhus](#)  
[Remiss:](#)  
[Allmänt:](#)

[Förberedelser:](#)  
[Hur undersökningen går till:](#)  
[Eftervård:](#)

---

Tillämpningsområde: Röntgen Halmstad Sjukhus

### Remiss:

Röntgenremiss.

### Allmänt:

Technetiumpreparat binds till ventrikelslemhinna.

### Förberedelser:

Patienten skall vara fastande 3-4 timmar innan undersökningen. Inneliggande patient skall ha venflon.

Om patienten är **gravid** bör inte undersökningen utföras, annat än i speciella fall och i samråd med nuklearmedicinsk läkare.

**Barn:** Under 3 år fastar 2 timmar innan undersökningen.

### Hur undersökningen går till:

Patienten får ligga på en brits, med kameran så nära magen som möjligt.

Buscopan ges intravenöst.

Undersökningen startas samtidigt som ett radioaktivt märkt ämne injiceras intravenöst.

Bilder tas fortlöpande timmen efter injektionen.

Uppehåll en timme och sedan ytterligare bildtagning under cirka en timme..

### Eftervård:

Ingen.