

Meckels Divertikelscintigrafi

Hitta i dokumentet

[Tillämpningsområde: Röntgen Halmstad Sjukhus](#)
[Remiss:](#)
[Allmänt:](#)
[Förberedelser:](#)
[Barn: Under 3 år fastar 2 timmar innan undersökningen.](#)

[Barn: Över 3 år skall vara fastande 3-4 timmar före undersökning.](#)
[Hur undersökningen går till:](#)
[Eftervård:](#)

Tillämpningsområde: Röntgen Halmstad Sjukhus

Remiss:

Röntgenremiss.

Allmänt:

Technetiumpreparat binds till ventrikelslemhinna.

Förberedelser:

Patienten skall vara fastande 3-4 timmar innan undersökningen. Inneliggande patient skall ha venflon.

Om patienten är **gravid** bör inte undersökningen utföras, annat än i speciella fall och i samråd med nuklearmedicinsk läkare.

Barn: Under 3 år fastar 2 timmar innan undersökningen.

Barn: Över 3 år skall vara fastande 3-4 timmar före undersökning.

För att blockera sköldkörteln från att plocka upp isotopen som administreras, ges kaliumjodid per oralt till barn.

Kaliumjodid 65 mg dosering:

Nyfödda yngre än 1 mån: ¼ tablett

1 mån-3 år: ½ tablett

3-12 år: 1 tablett

> 12 år: 2 tabletter

Hur undersökningen går till:

Patienten får ligga på en brits, med kameran så nära magen som möjligt.

Buscopan ges intravenöst.

Undersökningen startas samtidigt som ett radioaktivt märkt ämne injiceras intravenöst.

Bilder tas fortlöpande timmen efter injektionen.
Uppehåll en timme och sedan ytterligare bildtagning under cirka en timme.

Eftervård:

Ingen.

Uppdaterad 2024-11-20 av Madeleine Nilsson Karlén och Evelina Wesik. Mer specificerad text angående barn.