

Mellannålsbiopsi metodbeskrivning Röntgen Varberg

Hitta i dokumentet

[Patientförberedelser](#)
[Läkemedel](#)
[Duka sterilt](#)
[Lägg fram](#)

[Tillvägagångssätt](#)
[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Patientförberedelser

Röntgenjournal

Minst 4 timmars fasta

Patienten ska ha PVK

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning \(sharepoint.com\)](#). **Om patienten inte behandlas med antikoagulantia behövs ej blödningsprover.**

Ta puls och blodtryck vid behov

Patientsamtycke Biobank

Läkemedel

Klorhexidinsprit

Carbocain 10 mg/ml

Duka sterilt

Mellan set

Biopsinål 1,2 mm eller engångs mellannål 1,2 mm

Biopcutinstrument

Needleguide beroende på transducer

Needleguidekit

Sax

Lägg fram

Formalinrör

Biopsiväv

Tillvägagångssätt

1. Läkaren gör ultraljud
2. Sprittvätta och lägg på sterila dukar
3. Läkaren sätter needleguiden på transducern
4. Lägg gel på transducern
5. Stoppa transducern i strumpan
6. Läkaren sätter på needleguidekitet
7. Läkaren lägger bedövning och gör ett litet snitt i huden
8. Läkaren kopplar biopsinålen på biopcutinstrumentet och utför biopsin
9. Provet läggs på klippt bit av steril engångsduk och stoppas sedan i formalinrör
10. Sätt på lämpligt förband

11. Märk röret med födelsedata och namn samt datum och tid

Eftervård

Sängläge och fasta i 2 timmar. Vid leverbiopsi kan patienten ligga på höger sida om sticket blir från sidan.

Puls, blodtryck och bukstatus kontrolleras vid behov.

Patienten hämtas av sjuksköterska.

Uppdaterat från föregående version

2023-10-24: Lagt till en länk till vårdriktlinje "Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning".

2023-01-02: Ändrat innehåll under Duka sterilt. Provet läggs på klippt bit av steril engångsduk.

2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-28: Ändrat att pat kan ligga på höger sida om sticket blir från sidan.