

Miktionsurethrografi (Vuxen)

Hitta i dokumentet

[Rutin: Miktionsurethrocystografi \(Vuxen\)](#)
[Undersökning: Miktionsurethrografi /Urethrografi \(vuxen\)](#)

[Patientförberedelser](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Rutin: Miktionsurethrocystografi (Vuxen)

Undersökning: Miktionsurethrografi /Urethrografi (vuxen)

Urethrografi innebär retrograd kontrastundersökning av urethra.

Miktionsurethrocystografi- MUCG innebär antegrad undersökning av urethra och bedömning av den eventuella förekomsten av reflux till njurarna.

MUCG är numera sällsynta på röntgenavdelningen vad gäller vuxna patienter.

Indikation för MUCG är misstanke om reflux. Undersökningen ger också viss information om urethra.

Hos kvinnor är retrograd undersökning av den korta urethra svår och kvinnliga urethra undersöks ofta med miktionsundersökning.

Hos män kan urinblåsan kontrastfyllas till MUCG us med en HSG kateter som möjliggör bedömningen av urethra. Om uretran inte ska undersökas kan en vanlig KAD användas för kontrastfyllnad.

Indikationer för urethrografi är misstanke om strikturer eller fistlar. Urethrografi ingår inte längre i utredning av prostatahyperplasi eller prostatacancer.

Patienter som remitteras till ovanstående undersökningar skall ha varit föremål för bedömning av urolog, nefrolog eller gynekolog.

Patientförberedelser

Män som skall undersökas behöver ej kateteriseras och kan komma till röntgenavdelningen utan förberedelser.

När en kvinna undersöks fylles blåsan via en kateter. Kateter sätts av röntgenpersonal.

* Ingen laxering.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterat av Gábor Molnár 2021-05-12