

Myelografi HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

MR har i stort sett ersatt myelografi.

Undersökning av ryggmärgskanalen. Vanliga frågeställningar är diskbråck och spinal stenos. Görs ibland akut.

I lokalbedövning gör röntgenläkaren en lumbalpunktion (LP) och kontrastmedel injiceras intratekalt. Undersökningen tar ungefär 1 timma och medför inga eller ringa besvär för patienten. Ibland känns en kort smärtstöt i benen men detta är ofarligt.

Vanligtvis görs en CT-undersökning direkt efter kontrastinjektionen.

Därefter ska patienten till avdelning för eftervård. Efter 3 timmar kan patienten åka hem. Huvudvärk, illamående och kräkningar kan förekomma i efterförloppet och vid uttalade besvär kan patienten kontakta aktuell avdelning för råd.

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje om [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#).

Förberedelser

1. Waran ska sättas ut 5 dagar före undersökningen och färskt blödningsstatus ska finnas, ansvarig läkare ansvarar för detta.
2. Patienten ska åka till Röntgenmottagningen i säng.
3. Patienten ska var klädd i patientkläder

Eftervård

1. Sängläge med höjd huvudända i 3 timmar, puls och blodtryck vid behov.
2. Den polikliniska patienten får åka hem efter 3 timmar, dock inte köra bil själv.

Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Information om kontrastmedel borttaget.

2020-02-14: Kontakta aktuell avdelning för råd vid ev. besvär

2017-11-28: Tagit bort exempel på antikoagulantia.