

Myelografi metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)
[Steril uppdukning](#)
[Läkemedel](#)
[Genomförande](#)

[Eftervård](#)
[Biverkningar](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Förberedelser

Patienten är inläggande.
PVK

Steril uppdukning

Se uppdukningspärm i sterilrummet.

Läkemedel

Klorhexidinsprit
Carbocain 10 mg/ml
Ultravist 240 mg l/ml, 15 ml

Genomförande

Vinkla upp bordet cirka 20° och låt patienten lägga sig på vänster sida.
Tvätta med sprit och klä med sterila dukar.
Läkaren lägger bedövning.
Koppla mellanstycket till 20 ml-sprutan och spola igenom.
Läkaren punkterar, kopplar på mellanstycket och sprutar in kontrast. Nålen dras och ett plåster sätts på.
Se separat blad för bildtagning. (Vänd bilden vid bukläge. Hö- och vä-märken.)
Anteckna tiden för kontrastinjektion på röntgenjournalen.
Därefter görs en CT-myelografi på de av röntgenläkaren angivna nivåerna

Eftervård

På avdelning.
Sängläge i 3 timmar med höjd huvudända cirka 20°.
Polikliniska patienter får inte köra bil hem.

Biverkningar

Huvudvärk, illamående och kräkningar kan förekomma.

Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Årlig uppdatering utan ändring.
2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.
2017-11-28: Tagit bort att patienten kan vara på Dagoperation.

