

Njurbiopsi tumörfrågeställning metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Patientförberedelser](#)

[Läkemedel](#)

[Duka sterilt](#)

[Lägga fram](#)

[Tillvägagångssätt](#)

[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Patientförberedelser

Röntgenjournal

Minst 4 timmars fasta

Patienten ska ha PVK

Kontrollera aktuella blödningsprover

Ta puls och blodtryck vid behov

Patientsamtycke Biobank

Läkemedel

Klorhexidinsprit

Carbocain 10 mg/ml

Duka sterilt

Mellan set

Biopsinål 1,2 mm

Bioptycutinstrument eller engångs mellannål 1,2 mm

Needleguide beroende på transducer

Needleguidekit

Lägga fram

Formalinrör

Biopsiväv

Tillvägagångssätt

1. Patienten i bukläge
2. Läkaren gör ultraljud
3. Sprittvätta och lägg på sterila dukar
4. Läkaren sätter på needleguiden på transducern
5. Lägg gel på transducern
6. Stoppa ned transducern i strumpan
7. Läkaren sätter på needleguidekitet
8. Läkaren lägger bedövning och gör ett litet snitt i huden
9. Läkaren kopplar biopsinålen på bioptycutinstrumentet och utför biopsin
10. Provet läggs på vävbit och stoppas sedan i formalinrör
11. Sätt på lämpligt förband
12. Märk röret med födelsedata och namn, datum och tid

OBS! Proverna skickas till Halmstad.

Eftervård

Sängläge och fasta i 2 timmar

Puls, blodtryck och bukstatus kontrolleras vid behov

Patienten hämtas av sjuksköterska

Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Ändrat innehåll under Duka sterilt samt Eftervård.

2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-28: Ändrat nålar samt lagt till engångs mellannål