

Passageröntgen Röntgen HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

1. Vid passageröntgen används Gastrografin. Gastrografin administreras helt av patientansvarig klinik. Det ska utfärdas en remiss om en passagebild som ska tas 12-24 timmar efter avklarad administration av Gastrografin. Bildtagning ska ske på DAGTID.
2. Observera! Om patienten är uppmärkt för allergi mot jod/jodkontrast ska patienten premedicineras enligt gällande vårdriktlinje innan Gastrografin administreras.
3. Om kvarstående ileustillstånd och ytterligare bildtagning anses kliniskt viktig kan ny undersökning göras 12 timmar efter den första bilden, men sannolikt bättre efter 24 timmar. Ny remiss ska då utfärdas och undersökning ska ske på DAGTID.

Remiss för passageröntgen ska skrivas i anslutning till önskad tidpunkt för undersökning med aktuella kliniska uppgifter inklusive tidpunkt och mängd för Gastrografinadministration. Ileustillståndet kan ju ha lösts, alternativt kan patientens tillstånd ha försämrats så att operation eller CT är det mest adekvata. Remissen ska alltså innehålla tillräckliga upplysningar för radiologen att välja konventionell röntgenbild eller CT.

Alternativ till Gastrografin, om det endast är den terapeutiska effekten man eftersträvar, är t.ex. sorbitol.

Förberedelser

Alla patienter ska ha V-sond.

Eftervård

Ingen eftervård.

Uppdaterat från föregående version

2023-04-27: Årlig uppdatering utan ändring.
2021-11-01: Årlig uppdatering utan ändring.
2020-10-29: Lagt till punkt 2 gällande jodallergi och premedicinering.
2020-02-21: Årlig uppdatering utan ändring.
2017-11-28: Reviderad utan ändring