

Perikardtappning

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Utförs endast på remiss från kardiolog.

Görs då patienten har vätska/blod i hjärtsäcken som försämrar hjärtats pumpförmåga. Om vätskan inte avlägsnas kan hjärttamponad uppträda.

Röntgenläkaren lokaliserar vätskan i hjärtsäcken med ultraljud och därefter punkteras hjärtsäcken med en nål. Eventuellt kan ett drän kvarlämnas om risk finns att hjärtsäcken snart fyller på sig med vätska igen.

Behandlas patienten med antikoagulantia – se vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#). Gäller inte vid akuta tillstånd.

Förberedelser

1. Blödningsstatus PK, APTT och TPK
2. PVK
3. Premedicinering. Ordinerar av ansvarig läkare.
4. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

Eftervård

1. Fasta och sängläge i 2 timmar.
2. Puls och blodtryck kontrolleras vid behov.
3. Ev. annan eftervård ordinerar av ansvarig kardiolog.

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Årlig genomgång utan ändring.

2020-02-06: TPK

2017-11-28: Tagit bort exempel på antikoagulantia