

Perkutan pyelostomikateter metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)
[Steril uppdukning](#)
[Läkemedel](#)
[Tillvägagångssätt](#)

[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Förberedelser

1. Fasta minst 4 timmar. Ej akuta!
2. PVK.
3. Premedicinering. Ordineras av ansvarig läkare.
4. Profylaktisk antibiotikabehandling, ordineras av ansvarig läkare.
5. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.
6. Ifylld checklista med patienten till Röntgen.

Steril uppdukning

Se uppdukning i sterilrummet.

Läkemedel

Klorhexidinsprit
NaCl
Ultravist 240 ml l/mg
Carbocain 10 mg/ml
Xylocaingel 10%

Tillvägagångssätt

Patienten i bukläge med den aktuella sidan uppvriden.
Descutantvätt.
Steriltvätt.
Ultraljudsledd punktion av njurbäckenet.
Amplatzledare genom vald infart.
Kanalen till njuren dilateras via ledaren.
Flexima 8 French p-kateter förs på ledaren till rätt läge i njurbäckenet.
Fixeras med drain-fix. Koppla uribag till P-katetern.

Eftervård

1. Kontroll av allmäntillstånd och urinens färg.
2. Puls och blodtryck kontrolleras vid behov.
3. Försiktighet så katetern inte dras ut.

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Reviderad utan nämnvärd ändring

2020-02-06: Xylocaingel 10%
2017-11-28: Reviderad utan nämnvärd ändring