

# PTC (percutan transhepatisk cholangiografi) metodbeskrivning HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)  
[Steril uppdukning](#)  
[Läkemedel](#)  
[Tillvägagångssätt](#)

[Eftervård](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Förberedelser

1. OP-anmälan + narkosbedömning
2. Fasta från kl. 24:00
3. Blödningsstatus, PK, APTT och TPK ska tas
4. PVK
5. Premedicinering ordinerar av ansvarig läkare. Narkos beställs av röntgen
6. Profylaktisk antibiotikabehandling bör ges, antingen som dropp eller i engångsdos iv. 1/2 timma före undersökningen. Ordination och dosering av ansvarig läkare
7. Ifylld checklista med patient till Röntgen

## Steril uppdukning

Se uppdukningspärm i sterilrummet.

## Läkemedel

Klorhexidinsprit  
NaCl  
Ultravist 240 mg l/ml  
Carbocain 10 mg/ml

## Tillvägagångssätt

Patienten i ryggläge med höger arm över huvudet.

Descutantvätt.

Steriltvätt.

Narkosköterska sederar patienten.

Läkaren lokaliserar gallvägarna med ultraljud, sticker och sprutar kontrast. Via ledare läggs stentet, oftast läggs en One-step kateter för att kunna kontrollera funktion vid senare tillfälle. Koppla trevägskran, mellanstycke och uribag, alternativt proppas one-stepkatetern.

## Eftervård

1. Eventuellt några timmars eftervård på Postop, det avgörs av anestesipersonal i samråd med radiolog
2. Puls, blodtryck samt bukstatus kontrolleras regelbundet

3. Vid eventuell komplikation tillkallas ansvarig läkare

### **Uppdaterat från föregående version**

2022-09-06: Årlig genomgång utan ändring.

2020-02-06: TPK

2017-11-28: Reviderad utan ändring