

Byte av pyelostomikateter/suprapubisk kateter HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Görs polikliniskt via Urologimottagningen ungefär var tredje månad på kroniska kateterbärare eller akut via Akutmottagningen om det blivit stopp i katetern eller om den för övrigt inte fungerar tillfredsställande.

Med sterilt tillvägagångssätt byts den gamla katetern ut mot en ny som därefter kontrolleras och sköts som tidigare.

Vid oaktsamhet kan katetern dras ut. Var försiktig vid bäddning och förflyttning av patienten.

Förberedelser

- PVK
- Premedicinering - smärtlindrande och lugnande, ordineras av ansvarig läkare
- Antibiotikaproylax, ordineras av ansvarig läkare

Eftervård

Eventuellt kan eftervård behövas. Anvisningar om detta lämnas i varje enskilt fall.

Uppdaterat från föregående version

2023-03-27: Ersatt att us görs via Urologimottagningen istället för Operationsmottagningen
2023-01-02: Årlig uppdatering utan ändring.
2019-12-02: Årlig uppdatering utan ändring.
2017-11-21: Reviderad utan ändring.