

Sialografi – Spottkörtelröntgen Röntgen Halmstad

Hitta i dokumentet

[Undersökning](#)
[Patientförberedelser](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Metoden är på väg ut till förmån för MR Sialografi. (Vid enstaka tillfälle där salivproduktion/kontrastursköljning är viktigt kan den konventionella undersökningen ha värde, detta diskuteras med beställande läkare).

Undersökning

Undersökningen görs när man vill avbilda spottkörtlarnas gångsystem framför allt vid misstänkt sialectasi, Sjögrens syndrom, striktur osv. Ibland kan lokalisering av eventuell spottsten behöva göras med sialografi, men lågdos DT-undersökning tar allt större plats i diagnostiken, mer sällan används undersökningen för att bedöma en spottkörteltumor, där DT- och MRT-undersökning kan vara av värde.

Undersökningen utförs med patienten liggande. För patienten är det ungefär som att bli undersökt hos tandläkaren. Medan patienten gapar letar röntgentandläkaren upp aktuell utförgång (från parotis-eller submandibulariskörteln). För att se mynningen droppas citronsaft på tungan för att stimulera salivavsöndringen.

Gångens mynning vidgas med ett trubbigt instrument varefter en mycket tunn kateter stoppas in en kort sträcka. När patienten försiktigt stängt munnen tas bilder i flera projektioner efter kontrastinjektion av ett par ml jodkontrast.

Beställningen skall innehålla uppgifter om huruvida känd kontrastmedelsallergi föreligger eller ej.

Patientförberedelser

Inga förberedelser.

Uppdaterat från föregående version

2021-06-08

2025-04-01 Årlig uppdatering.