

Sialografi

Hitta i dokumentet

[Rutin: Sialografi](#)
[Undersökning: Spottkörtelröntgen med kontrast](#)

[Patientförberedelser:](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Rutin: Sialografi

Metoden är på väg ut till förmån för MR Sialografi. (Vid enstaka tillfälle där salivproduktion/kontrastursköljning är viktigt kan den konventionella us ha värde, detta diskuteras med inremitterande läkare).

Undersökning: Spottkörtelröntgen med kontrast

Undersökningen görs när man vill avbilda spottkörtlarnas gångsystem ffa vid misstänkt sialectasi, Sjögrens syndrom, striktur osv.

Ibland kan lokalisering av eventuell spottsten behöva göras med sialografi, men lågdos DT undersökning tar allt större plats i diagnostiken, mer sällan används undersökningen för att bedöma en spottkörteltumor, där DT och MRT undersökning kan vara av värde.

Undersökningen utförs med patienten liggande. För patienten är det ungefär som att bli undersökt hos tandläkaren. Medan patienten gapar letar röntgentandläkaren upp aktuell utförsång (från parotis-eller submandibulariskörteln). För att se mynningen droppas citronsaft på tungan för att stimulera salivavsöndringen.

Gångens mynning vidgas med ett trubbigt instrument varefter en mycket tunn kateter stoppas in en kort sträcka. När patienten försiktigt stängt munnen tas bilder i flera projektioner efter kontrastinjektion av ett par ml jodkontrast.

Remissen skall innehålla uppgifter om huruvida känd kontrastmedelsallergi föreligger eller ej.

Patientförberedelser:

Inga föreberedelser.

Uppdaterat från föregående version

2021-06-08 uppdatering av Gábor Molnár

