

# Suprapubisk kateter HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)  
[Förberedelser](#)  
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Allmänt om undersökningen

Görs för att avlasta urinblåsan då patienten av någon anledning inte kan ha KAD.

Patienten ligger på rygg på undersökningsbordet. Med sterilt tillvägagångssätt och i lokalbedövning punkteras blåsan med en tunn nål. Detta sker med vägledning av ultraljud. En ledare läggs in och över denna förs sedan en kateter med låsbar kringla.

Behandlas patienten antikoagulantia – se vårdriktlinje om [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning](#).

Vid oaksamhet kan katetern dras ut. Var försiktig vid bäddning och förflyttning av patienten.

## Förberedelser

1. Fasta 4 timmar. Ingen fasta vid akut undersökning.
2. PVK
3. Premedicineras. Ordineras av ansvarig läkare.
4. Profylaktisk antibiotikabehandling. Ordineras av ansvarig läkare.
5. KAD stängd minst 20 minuter innan inläggning
6. Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

## Eftervård

Eventuellt kan eftervård behövas. Anvisningar om detta lämnas i varje enskilt fall.

### Uppdaterat från föregående version

2022-08-04: Årlig uppdatering utan ändring.

2020-02-14: Stängd KAD

2017-11-28: Tagit bort exempel på antikoagulantia. Lagt till ab-beh vid förberedelser.