

Thyreoideascintigrafi

Hitta i dokumentet

[Tillämpningsområde: Nuklearmedicinska kliniken Halmstad](#)

[Remiss:](#)

[Allmänt:](#)

[Förberedelser:](#)

[Hur går undersökningen till:](#)

[Eftervård:](#)

Tillämpningsområde: Nuklearmedicinska kliniken Halmstad

Remiss:

Röntgenremiss.

Allmänt:

För kartläggning av anatomi och funktion av sköldkörtelvävnad. Områden med ökad resp. minskad aktivitet kan ses liksom relationen till eventuellt palpationsfynd. Blodprov avseende thyreoideafunktion skall alltid vara tagna för att avgöra om indikation för undersökningen föreligger.

Förberedelser:

Mediciner av typ thyreostatika skall sättas ut 1 vecka före undersökningen.

Inget jod innehållande kontrastmedel eller hostmedicin eller hälsokostpreparat får tas 4 veckor innan undersökningen.

Om **röntgenundersökning med intravenös kontrast** är utförd måste man **vänta 3 månader** innan scint kan utföras.

Om **punktion** av körteln utförts bör man vänta med undersökningen i **4 veckor**.

Om patienten är **gravid** bör undersökningen **inte utföras** annat än i särskilda fall och i samråd med nuklearmedicinsk läkare. Inneliggande patient skall ha venflon.

Hur går undersökningen till:

Ett radioaktivt märkt ämne, som tas upp i sköldkörtelvävnad injiceras intravenöst. Patienten får därefter vänta i ca 10 minuter.

Innan bilderna tas får patienten dricka 2 muggar vatten. Patienten får ligga på en brits med en kamera över halsen. Bildtagningen tar ca 20 minuter.

Ibland vill vår doktor palpera thyreoidea när bilderna är tagna.

Personal finns i rummet under hela undersökningen.

Eftervård:

Ingen

Dokumentet uppdaterat 2023-09-22. Ändrat i förberedelser Inget jodinhållande kontrastmedel eller hostmedicin eller hälsokostpreparat får tas 4 veckor innan undersökningen.