

Tunntarmspassage akut

Hitta i dokumentet

[Rutin: Tunntarmspassage akut](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

[Patientförberedelser:](#)

Rutin: Tunntarmspassage akut

Undersökning: Tunntarmspassage akut.

Med denna undersökning avses vanligen kartläggning av tunntarmens passageförhållanden. Us oftast görs istället i form av lågdos CT.

Undersökningen används undantagslöst vid frågeställning: "ileus"?

Undersökningen skall alltid föregås av CT buk som ofta kan besvara frågan om nivå på hinder.

Patienten får ca 3 - 3,5 dl kontrast blandning(500mg/ml) att dricka. Patienten skall därefter inta höger sidoläge och eventuell ventrikelsond stänges 1 timma, för att kontrasten skall kunna lämna ventrikeln.

Som regel första bild tas efter 24 timmar och därefter tas bilder så länge det bedöms att ytterligare information står att vinna med detta efter ytterligare ett dygn.

Vid speciella fall enligt läkarordination.

Kontrasten består av bariumkontrast.

Man skall tänka på att kontinuerligt bedöma patienten kliniskt och givetvis avbryta passageundersökningen om terapeutisk åtgärd behöver vidtagas.

Patientförberedelser:

I princip inga förberedelser. Om patienten har ventrikelsond skall denna stängas av tills första bilden tagits.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad av Gábor F. Molnár 2021-05-12

