

Tunntarmspassage akut Röntgen Halmstad

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Undersökning](#)
[Patientförberedelser](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Med denna undersökning avses vanligen kartläggning av tunntarmens passageförhållanden. Undersökning görs oftast i stället för i form av lågdos CT passage.

Undersökningen används vid frågeställning: "ileus"?

Undersökning

Undersökningen skall alltid föregås av CT buk som oftast kan besvara frågan om nivå på hinder.

Patienten får ca 3 - 3,5 dl kontrastblandning(500mg/ml) att dricka. Patienten skall därefter inta höger sidoläge och eventuell ventrikelsond stänges 1 timma, för att kontrasten skall kunna lämna ventrikeln.

Som regel tas första bilden efter 24 timmar och därefter tas bilder så länge det bedöms att ytterligare information står att vinna med detta.

Kontrasten består av bariumkontrast.

Man skall tänka på att kontinuerligt bedöma patienten kliniskt och givetvis avbryta passageundersökningen om terapeutisk åtgärd behöver vidtagas.

Patientförberedelser

I princip inga förberedelser. Om patienten har ventrikelsond skall denna stängas av tills första bilden tagits (men minst 1 timma).

Uppdaterat från föregående version

2025-03-14 Årlig uppdatering.