

TVSS – Terapeutisk sväljningsröntgen med logoped

Röntgen Halmstad sjukhus

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Syfte](#)
[Undersökningen](#)
[Förberedelser](#)

[Utredning och bedömning.](#)
[Remiss](#)
[Uppdaterad 2021-02-15/inga ändringar](#)

Sammanfattning

TVSS (terapeutisk videografisk sväljningsstudie) görs på patienter, vuxna och barn, med sväljsvårigheter och sker alltid tillsammans med en logoped.

Syfte

Huvudsyftet är att identifiera sväljsvårigheter och vid behov utvärdera effekten av terapeutiska åtgärder som syftar till att säkerställa en effektiv och säker sväljning. Om remittentens frågeställning/huvudsyfte är att upptäcka eventuella morfologiska avvikelser (tumör, divertikel osv.) gäller istället en sedvanlig hypofarynx/esofagus-undersökning utan logoped närvarande.

Undersökningen

När patienten är på plats tas TVSS-sekvenserna med utgångspunkt ur det standardiserade sväljningsprotokollet MBSImP, vilket innebär att majoriteten av sekvenserna tas i lateral projicering men enstaka även i frontalprojektion. Antal testade konsistenser individanpassas utifrån den frågeställning som föreligger. Vid undersökningen kan olika positioneringar och sväljtekniker prövas.

Förberedelser

Kallelse och anamnesformulär skickas från röntgen. Anamnesformuläret ska fyllas i av patienten och tas med vid besöket och lämnas till logopeden (gäller öppenvårdspatienter). Patienter som inte kan gå själva bör komma i rullstol till röntgen. Om det är möjligt, ska en anhörig eller personal som vet hur patienten äter och dricker, medfölja.

Utredning och bedömning.

Vid en funktionell bedömning av sväljningen finns möjlighet att bedöma den orala, faryngeala och esofageala fasen av sväljningsakten.

Remiss

Vid önskan om undersökning enligt TVSS remitteras patienten, oftast i samråd med logoped, till röntgenkliniken med frågeställning TVSS.

Uppdaterad 2021-02-15/inga ändringar