

# Ventrikel magsäcksröntgen Barn

---

## Hitta i dokumentet

[Undersökning: Ventrikelundersökning Barn](#)  
[Patientförberedelser:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Undersökning: Ventrikelundersökning Barn

Vid frågeställning pylorusstenos (trång nedre magmun) utföres undersökningen ofta akut. Vid övriga frågeställningar - som inte är så vanliga hos barn - tidsbeställs undersökningen på vanligt sätt.

### Pylorusstenos-frågeställning:

När ultraljudsundersökning varit inkonklusiv.

Kontrast, vanligen vattenlöslig ges till barnet via sond, som skall vara satt när patienten kommer till röntgen.

I genomlysning bedöms och dokumenteras härefter magsäckens tömningsförmåga och utseendet av magsäck och nedre magmun. Även övre delen av tunntarmen skall bedömas med avseende på eventuell malrotation.

### Annan frågeställning:

Barnet får dricka kontrast varefter bildtagning sker i liggande. Yngre barn har ofta tillräckligt med luft i magsäcken så att dubbelkontrastbedömning är möjlig.

### Patientförberedelser:

Nasogastisk sond skall vara satt när patient kommer till röntgen.

### Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad av Gábor F. Molnár 2021-05-12