

Ventrikelröntgen Vuxna

Hitta i dokumentet

[Rutin: Ventrikelröntgen vuxna](#)

[Patientförberedelser:](#)

[Undersökning ventrikelröntgen vuxna](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Rutin: Ventrikelröntgen vuxna

Tillämpningsområde: Röntgen Halmstad Sjukhus

Undersökning ventrikelröntgen vuxna

Utöver magsäcken undersöks vid ventrikelundersökning även början av tolvfingertarmen.

Om det i remissen framkommer misstanke om bråck på övre magmunnen (hiatushernia) tas särskilda bilder på detta område. Om endast denna frågeställning föreligger skall istället matstrupsundersökning beställas.

Indikation anatomiutredning, passage/ventrikeltömning, ev storlek på hernia.

Vid frågeställning ulcus/magsår/ andra slemhinneförändringar anses ventrikelröntgen inte längre vara en accepterad metod för att utesluta detta;
Gastroskopi är den enda metod för att påvisa/utesluta ulcus.

1. Magsäcksröntgen utförs normalt på så sätt att patienten får dricka ett bariumkontrastmedel.
2. Därefter får patienten inta brusande (Samarin) (natriumbikarbonat). Magsäcken spänns ut av gas och bilderna tas i olika projektioner liggande och även stående.

Patientförberedelser:

Patienten skall vara fastande från kl 24.00. Man får inte heller röka, snusa eller tugga tuggummi.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterat av Gábor F. Molnár 2021-05-10