

# Ventrikeltömningsscintigrafi

---

## Hitta i dokumentet

[Remiss:](#)

[Allmänt:](#)

[Förberedelser:](#)

[Hur undersökningen går till:](#)

[Eftervård:](#)

---

## Remiss:

Röntgenremiss.

## Allmänt:

Visar rubbningar av ventrikelns tömningsförmåga, främst i form av nedsatt tömningshastighet vid bl.a. diabetesneuropati, gastrointestinal pseudo-obstruktion, efter ventrikelkirurgi och radioterapi.

## Förberedelser:

Om patienten är **gravid** bör inte undersökningen utföras, annat än i speciella fall och i samråd med nuklearmedicinsk läkare.

Prepulsid och Primperan sättes ut i två dygn före undersökningen.

Patienten skall vara fastande och icke rökande från kl 24.00.

**Diabetes:** Morgoninsulinet får tas på avdelningen i samband med måltid före undersökningen. Vid behov får patienten ta druvsocker vid insulinkänning.

## Hur undersökningen går till:

Isotopen ges per os i omelett alternativt yoghurt/gröt/välling.

Undersökningstid 3 timmar. Eventuellt tas en 7 eller 24 timmars bild.

## Eftervård:

Ingen.

Uppdaterat 2025-01-29 Ingen ändring / Madeleine Nilsson Karlén