Region Halland

Endoftalmiter, kluster efter intravitreal injektion

Hitta i dokumentet

Administration när diagnosen är ställd:
Vad är ett kluster
Åtgärder vid identifierat kluster
Bilaga 1: Checklista vid endomftalmit
Uppdaterat från föregående version

Endoftalmit, kluster efter intravitreal injektion

Administration när diagnosen är ställd:

- Informera verksamhetschef/TF och MLF.
- Verksamhetschef och MLF ansvarar för att berörd personal informeras.
- MLF sparar/håller ordning på alla endoftalmiter och signalerar om det kan handla om ett kluster.
- Registrering i makularegister av patient som fått injektion, MLF ansvarar.
- Använd diagnoskod H441 (Andra endoftalmiter) och T814 (Infektion efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats)

Endoftalmitincidens (enligt FASS) efter intravitrial injektion med Eylea: 1/1000.

Vad är ett kluster

Det finns ingen definition men på vår klinik har vi bestämt oss för följande definition: Överväg kluster om mer än 4 endoftalmiter per rullande 12-månadersperiod. ELLER 2 endoftalmiter inom en månad.

Åtgärder vid identifierat kluster

Stoppa op tills checklista nedan är genomgången (Verksamhetschef/TF fattar beslut i samråd med MLF).

Årlig kvalitetsmätning

Verksamhetschefen ansvarar för. En gång om året i samband med APT delegeras till lämplig person att se över och presentera de gångna årets endoftalmiter, förslagsvis ST-läkare.

Bilaga 1: Checklista vid endomftalmit

Uppdaterat från föregående version

2025-10-08 redaktionell ändring/bkn
210623: Ny rutin med länk till checklista/Bkn