

Skyddsutrustning – påklädning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

Följ basala hygienrutiner med tillägg av:

- Munskydd/Andningsskydd (FFP2, N95 eller FFP3)
 - Hos nyinsjuknade patienter (misstänkt med symtom eller konstaterat smittade) rekommenderas andningsskydd användas vid längre tids (>15minuter) patientnära arbete (<2 meter) under de sju första dagarna efter symtomdebut. Utanför dessa kriterier används munskydd.
 - Andningsskydd används alltid vid aerosolgenererande procedurer (AGP)*.
 - Andningsskydd kan användas under 4 timmar om det inte tagits av, skadats eller förorenats.
- Visir

Påklädning av skyddsutrustning

- Desinfektera händer och underarmar
- Ta på kortärmat plastförkläde
- Ta på munskydd/andningsskydd
 - Vid AGP* ska andningsskydd användas och tas på utanför rummet
- Ta på visir
- Vid risk för kontakt med kroppsvätska, använd handskar

*Exempel på aerosolgenererande procedurer: handventilering, sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem, endotrakeal intubation/extubation, nasal höglödesterapi (Optiflow©), icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), trakeotomi, trakeostomivård, hjärt-lungräddning, bronkoskopi och provtagning från nedre luftvägar.



Skyddsutrustning – avklädning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

- Ta av handskar, desinfektera händer och underarmar
- Ta av plastförkläde, desinfektera händerna



- Ta av visir bakifrån, desinfektera händerna



- Ta av munskydd/andningskydd bakifrån, desinfektera händer/underarmar



Alternativt



Vid aerosolgenererande procedurer (AGP) ska andningskyddet tas av **utanför** rummet

Hantera tvätt och avfall på sedvanligt sätt
Endast betydligt nedsmutsad tvätt och avfall hanteras som smittförande