

Tillhör du riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion (bakterie som orsakar bland annat lunginflammation)?

Ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion har du som:

- är 65 år eller äldre
- har en **kronisk hjärt- eller lungsjukdom, nedsatt lungfunktion, nedsatt hostkraft** (pga t ex kronisk neurologisk sjukdom eller extrem fetma), **kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes, alkohol- eller drogmissbruk, är rökare eller svetsare.**

Om du tillhör någon av grupperna ovan rekommenderas du att vaccinera dig mot pneumokocker. Vaccinet Pneumovax ges vid *ett* tillfälle och kan ges samtidigt som du vaccineras mot influensa.

Om du tidigare blivit vaccinerad mot pneumokocker ska du inte vaccinera dig igen, upprepade eller för tät vaccination kan leda till sämre skydd.

Särskilt hög risk för allvarlig pneumokockinfektion har du som:

- har **nedsatt mjältfunktion** (pga sjukdom eller bortopererad mjälte), **likvorläckage** (läckage av spinalvätska), **cochleaimplantat, cystisk fibros, nedsatt immunförsvar pga t ex stamcellstransplantation, sicklecellanemi, cancer i benmärgen, lungcancer, organtransplantation, behandling med cellgifter eller andra läkemedel som sätter ned immunförsvaret (t ex TNF-alfahämmare, monoklonala antikroppar).**

Om du tillhör någon av grupperna med särskilt hög risk för allvarlig infektion rekommenderas du att vaccinera dig. Om du är osäker på om du har skydd mot pneumokocker sedan tidigare kontakta din läkare för bedömning av vilket vaccin som rekommenderas.

Eftersom det i ditt fall kan vara aktuellt med en kombination av flera vaccin och upprepade doser kan detta inte göras i samband med influensavaccinationen, utan bör ske vid ett annat tillfälle.