

Vanliga frågor och praktiska råd om influensavaccination

Dessa frågor besvaras utifrån bestämmelser i författning och nationella rekommendationer. Region Hallands verksamheter i egen regi följer normalt dessa rekommendationer. Respektive vårdgivare och verksamhetschef ansvarar för att rutiner finns för att ha nödvändig säkerhet i verksamheten.

Läkare på plats

Läkare behöver inte finnas i lokalerna eller på annat sätt nära till hands för att vaccin ska kunna administreras.

Handskar

Vid kontakt med kroppsvätskor bör handskar användas. Sådan kontakt sker inte vid vaccination och handskar rekommenderas därför inte. Basala hygienrutiner ska iakttas.

Aspirering

Det finns ingen evidens för att sprutan behöver aspireras före injektion av vaccin i deltoideus vid användning av den korta kanyl som finns på de förfyllda sprutorna.

Ordinationsrätt

Läkare har full ordinationsrätt för influensavaccin till alla patienter. Distriktsjuksköterskor och sjuksköterskor med vidareutbildning inom barn- och ungdomsmedicin har ordinationsrätt för de vaccin som ingår i nationella vaccinationsprogram. Dit hör influensavaccin som ges till de av Folkhälsomyndigheten prioriterade grupperna (alla över 65 år, medicinska riskgrupper inkl. gravida från graviditetsvecka 16, nära hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och hälso- och sjukvårdspersonal som har nära kontakt med personer i riskgrupper). Pneumokockvaccination av vissa grupper ingår också i det nationella vaccinationsprogrammet och ingår alltså i denna ordinationsrätt. Även övriga sjuksköterskor som har motsvarande utbildning som distrikts- eller barnsjuksköterskor avseende vacciner kan få rätt att ordinera. Det är då verksamhetschefen som godkänner den utbildning som sjuksköterskan gått och ger ett skriftligt uppdrag till sjuksköterskan om att ordinera influensavaccination till prioriterade grupper på samma sätt som ovan. Blankett för Region Hallands verksamheter finns [här](#). För all övrig influensavaccination krävs läkarordination (till exempel till annan personal och till friska under 65 år). Ordinationsrätten kan inte delegeras och vaccin kan inte ges enligt generell ordination, se under generella direktiv. Sjuksköterskors ordinationsrätt regleras i författningstext i HSLF 2018:43.

Generella direktiv/generell ordination och delegering

Influensavaccination bör inte ges enligt generella direktiv annat än i enstaka undantagsfall. Ordinationsrätt för läkemedel kan inte delegeras sedan den nya föreskriften avseende detta kom 2018. Bestämmelserna finns i HSLF 2017:37.

NOAK/Waran

Personer med pågående behandling med Waran eller NOAK bör om möjligt vaccineras subkutant istället för intramuskulärt, observeras och få tryck över vaccinationsstället i minst 10 minuter efter injektion. Vid Waranbehandling rekommenderas också stabilt PK och vid NOAK-behandling bör om möjligt injektionen ges nära före nästkommande NOAK-dos som möjligt. För mer detaljerade råd och anvisningar se <https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukt/koagulationssjukdomarochplasmaprodukt/vaccinationochoralaantikoagulantia.5.78ae827d1605526e94b8fd4f.html>

Äggallergi

Influensavaccin kan innehålla spår av äggprotein (ovalbumin) från tillverkningsprocessen. Patienter med äggallergi som dock inte reagerat med anafylaxi kan normalt vaccineras på vanligt sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder. Vid osäkerhet, konsultera läkare och vid behov allergolog.

Hälsodeklaration

För att säkerställa att faktorer som kan påverka vaccinationen kommer fram rekommenderas att använda hälsodeklarationsblankett som finns att ladda ned på Influensavaccinationssidan på Vårdgivarwebben.

Avgift

Influensavaccination är i år avgiftsfri för alla över 65 år, medicinska riskgrupper inkl gravida från graviditetsvecka 16 och nära hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Övriga betalar normalt 280 kr. Var god se Avgiftshandboken för detaljer. Region Halland och flera andra vårdgivare har utöver detta beslutat att erbjuda sin personal gratis vaccination.

Pneumokockvaccination

För att minska smittrisk och förenkla för patienterna kan det vara en fördel att erbjuda pneumokockvaccination till vissa samtidigt som influensavaccinationen. Särskilt informationsblad till hälso- och sjukvårdspersonal med råd om vaccinval etc finns framtaget och även ett patientinformationsblad. Du hittar detta på Influensavaccinationssidan. I Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer finns också information.

Desinfektion

Insticksstället bör desinfekteras före injektion. Basala hygienrutiner tillämpas i övrigt.