

# Registreringsanvisningar- SVF kodning

## SVF Primära maligna hjärntumörer

2018-10-03

Region Halland

Werner Carina, Cecilia Littorin RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD



### Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinatör på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinatör på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande. Koordinatör i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

### Registrering av koder

Start av SVF koder med VL210 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss, alternativ startkod sätt i läkaranteckning utan besöksanteckning. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök, koder startkoden VL210 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

**Kodning av Bas/utökad utredning ingår i förloppet**

SVF Primära maligna hjärntumörer			
SVF	REGISTRERING	KOMMENTAR	
1	Beslut om <b>välgrundad misstanke om</b> primära maligna hjärntumörer. Remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF" Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en misstanke om primära maligna hjärntumörer ska patienten registreras i förloppet.	Kodas med <b>VL210</b>	Primärvården fattar beslut misstanke om cancer. Datum för start i förloppet är remissdatum
<b>Avslut av SVF vid start av behandling Nedan behandlingar sker i Göteborg eller Lund.</b>			
2	<i>Behandlingsbeslut vid misstanke om högmalign tumör grad III-IV.</i>	<i>Kodas med VL243</i>	<i>Koden markerar att det efter radiologisk utredning finns misstanke om högmalign tumör. Koden kan sättas vid MDK eller remissbedömning, men det är inte i första hand tidpunkten för beslutet som kommer att följas. Kodens syfte är att i ledtidsmätningen separera patienter som behandlats med misstanke om hög- eller lågmaligna tumörer.</i>
3	<i>Behandlingsbeslut vid misstanke om lågmalign tumör grad I-II.</i>	<i>Kodas med VL244</i>	<i>Koden markerar att det efter radiologisk utredning finns misstanke om lågmalign tumör. Koden kan sättas vid MDK eller remissbedömning, men det är inte i första hand tidpunkten för beslutet som kommer att följas. Kodens syfte är att i ledtidsmätningen separera patienter som behandlats med misstanke om hög- eller lågmaligna tumörer.</i>
4	<i>Start av första behandling, läkemedel</i>	<i>Kodas med VL252</i>	<i>Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.</i>
5	<i>Start av första behandling, palliativ Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>	<i>Kodas med VL258</i>	<i>Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumorspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva</i>

			<i>behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen</i>
6	Start av första behandling, beslut om expektans	Kodas med VL260	Innebär expektans med övervakning, tillsvidare utan behandling. Koden ska vid datum för behandlingsbeslutet.
7	Ingen ytterligare åtgärd	Kodas med VL273	Datum för besked till patienten om att ekologisk behandling inte ska utföras. Koden används när operationen visar sig vara tillräcklig som behandling.
<b>Avslut av SVF av annan orsak</b>			
8	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	Kodas med VL270	Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.
9	På grund av annan cancer	Kodas med VL272	Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.
10	Ingen ytterligare åtgärd	Kodas med VL273	Datum för besked till patienten om att ekologisk behandling inte ska utföras. Koden används när operationen visar sig vara tillräcklig som behandling.
11	Andra medicinska skäl Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!	Kodas med VL274	Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.
12	Patientens val	Kodas med VL276	Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).
13	Patientvald väntetid	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning- koden används endast för intern uppföljning.
14	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VL278	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
<b>Felkodning</b>			

15	Rättning vid felkodning	Kodas med VL270	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VL270. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras.
<b>Överflyttad till/från annat landsting/region</b>			
16	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VL290	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
17	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VL291	Datum då patient mottogs från annat län/region
<b>Övriga koder</b>			
18	<b>Multidisciplinär konferens MDK</b>	<b>Kodas enligt rutin VL235</b>	<b>Obligatorisk</b>
19	<b>Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat</b>	<b>Kodas med VL240</b>	<b>Obligatorisk</b>
20	<b>Behandlingsbeslut</b>	<b>Kodas enligt rutin</b>	<b>Obligatorisk</b>