

## Lathund: Smittspårning och provtagning kring brukare i kommunal vård- och omsorg

### Brukare identifierad som nära kontakt

- Provtagning **direkt** och **dag 4** efter senaste exponering (PCR)\*.
- Smittspårning och provtagning ska ske om index är:
  1. Medpatient oavsett symtom\*
  2. Personal med symtom oavsett source control\*
- Smittspårning och provtagning behöver **INTE** ske om:
  1. Index är positiv **symtomfri** personal som använt adekvat source control.
  2. Om >5 dagar passerat sedan exponering.

Vid symtom ska PCR-provtagning alltid ske\*

### Index är en brukare som utvecklar symtom på covid-19 (oväntat fall)

- Patient testas snarast (PCR).
- Vid positivt utfall bedöms index som smittsam från 48 timmar före symtomdebut.
- Smittspårning startas genom kartläggning\*\* av nära kontakter under smittsam fas.
  1. Symtomfri personal, som använt source control 48 timmar innan symtomdebut, och full skyddsutrustning efter symtomdebut i vårdnära arbete, undantas testning.
  2. Symtomfri personal som INTE använt source control/full skyddsutrustning testas\* (antigen minst t o m dag 5 från exponering, PCR dag 4).
  3. Eventuella medpatienter testas\* (PCR direkt och dag 4 från senaste exponering).

Vid symtom ska PCR-provtagning alltid ske\*

### Symtomfri brukare som testar positivt i en smittspårning

- Symtomfri index bedöms smittsam från 48 timmar provtagningsdag.
- Smittspårning startas genom kartläggning\*\* av nära kontakter under smittsam fas.
  1. Symtomfri personal som använt source control i vårdnära arbete undantas testning.
  2. Symtomfri personal som INTE använt source control testas\* (antigen minst t o m dag 5 från exponering, PCR dag 4).
  3. Eventuella medpatienter testas\* (PCR direkt och dag 4 från senaste exponering).

Vid symtom ska PCR-provtagning alltid ske\*

\*normalt sett undantas de som testat positivt för covid-19 senaste 3 månaderna.

\*\*Kartläggning – identifiera nära kontakter (<2 m >15 min)