

43-44
kod

Registreringsanvisningar- SVF kodning

SVF Cancer med okänd primärtumör - CUP

2022-02-14

Region Halland

Werner Carina, Cecilia Littorin RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD

Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

Registrering av koder

Start av SVF koder med VP910 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar, koder startkoden VP910 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

Kodning av Bas/utökad utredning ingår i förloppet

SVF Cancer med okänd primärtumör - CUP		
	REGISTRERING	KOMMENTAR
1	<p>Beslut om vägrundad misstanke cancer med okänd primärtumör - CUP remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF"</p> <p>Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en välgrundad misstanke om cancer med okänd primärtumör - CUP.</p>	<p>Kodas med VP910</p> <p>Primärvården eller annan remittent fattar beslut om välgrundad misstanke. Datum för start i förloppet är remissdatum.</p>
Avslut av SVF vid start av behandling		
2	Start av första behandling, kirurgi	<p>Kodas med VP950</p> <p>Start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling</p>
3	Start av första behandling, läkemedel	<p>Kodas med VP952</p> <p>Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.</p>
4	Start av första behandling, palliativ <i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>	<p>Kodas med VP958</p> <p>Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumorspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen</p>
5	Behandlingsbeslut efter basutredning	<p>Kodas med VP943</p> <p>Används när patienten inte genomgått en utökad utredning.</p>
6	Behandlingsbeslut efter utökad utredning	<p>Kodas med VP944</p> <p>Utökad utredning i detta vårdförlopp innebär att patienten genomgår kompletterande diagnostik (block D och E) mellan MDK och behandlingsbeslutet. Koden ska endast användas när patienten har genomgått utökad utredningen enligt ovan. Den ska inte användas för att utredningen tar längre tid p.g.a. samsjuklighet eller liknande.</p>
Avslut av SVF av annan orsak		

7	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	Kodas med VP970	Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.
8	På grund av annan cancer	Kodas med VP972	Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.
9	Andra medicinska skäl Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!	Kodas med VP974	Efter läkarbedömning, t.ex. när annan allvarlig sjukdom behöver behandlas först (annan cancer, covid-19, stroke eller liknande), eller patienten avlider innan start av behandling.
10	Patientens val	Kodas med VP776	Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).
11	Patientvald väntetid	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning – koden används endast för intern uppföljning.
12	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VP978	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
Felkodning			
13	Rättning vid felkodning	Kodas med VP970	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VP970. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras.
Överflyttad till/från annat landsting/region			
14	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VP990	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
15	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VP991	Datum då patient mottogs från annat län/region.

			<p>Den region som avslutar SVF (vid start av behandling eller av annan orsak) ska rapportera hela vårdförloppet till den nationella väntetidsdatabasen, även när SVF har startats i en annan region. Regionen ska då rapportera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datum för välgrundad misstanke (VP910) 2. Datum för remissmottagande (VP991) samt vilken region som remitterat patienten 3. Datum för avslut (VP950 till VP978) 4. Patientens folkbokföringslänskod <p>När en SVF-patient remitteras till en annan region är det därför viktigt att remissen innehåller information om datum för välgrundad misstanke</p>
Övriga koder			
	Multidisciplinär konferens MDK Alternativt SVF kod	Kod enligt rutin VP935	Obligatorisk
16	Information om diagnos/ utredningsresultat	Kodas med VP940	Obligatorisk
17	Behandlingsbeslut	Kodas enligt rutin	Obligatorisk

2022-02-14 Kod VP974 tillagd förklarande text. Kod VP991 Förtydligat vad som ska rapporteras till nationella databasen.