



# Förpackningsförändringar för innohep® (tinzaparin)

## Sprid gärna denna information till berörda.

Fr o m juli 2022 genomför LEO Pharma en förpackningsförändring för läkemedlet innohep® - lågmolekylärt heparin inom antitrombos.

- 6-pack utgår och ersätts med 10-pack. Förändringen gäller behandlingsstyrkorna 8000 IE – 18000 IE. Den nuvarande 30-packen finns kvar, men innehåller 3x10 istället för 5x6 sprutor, varför även den förpackningen får nytt varunummer. Förändringen genomförs i hela Norden för att harmonisera produktionen till övriga europeiska länder och därmed öka leveranssäkerheten.
- Primärmärkning införs – dvs på varje enskild spruta kommer en 2D-märkning med QR-kod för en säkrare hantering och bättre identifiering. Märkningen är i linje med EU-kommissionens förordning och ändringen genomförs på hela sortimentet – alltså även för det s k profylaxsortimentet med styrkorna 2500 IE - 4500 IE.

Advancing the care of patients with thrombosis

LEO Pharma AB  
Box 404  
201 24 Malmö

Main +46 40 35 22 00

www.leo-pharma.com  
Org.nr: 556075-4318

MAT-57223

Maj 2022

### Varunummer

Styrka (förfyllda sprutor)	Utgående 6-pack	Ny 10-pack	Utgående 30-pack	Ny 30-pack
Innohep® 8000 IE	482567	542632	127820	159554
Innohep® 10000 IE	096752	536695	096763	145468
Innohep® 12000 IE	466927	064271	140258	097622
Innohep® 14000 IE	096785	502477	096797	435452
Innohep® 16000 IE	550708	192986	531523	590593
Innohep® 18000 IE	096819	112933	096830	159402



Exempel på ny märkning

Det nya priset blir detsamma per spruta som tidigare.

Doseringstabeller och patientinstruktioner m m kan beställas via [innohep.se](http://innohep.se) eller ett mail till [info.se@leo-pharma.com](mailto:info.se@leo-pharma.com). Kontakta oss gärna även vid frågor eller idéer om hur vi kan fortsätta utveckla och förbättra våra läkemedel inom trombos.

Med vänlig hälsning

### Per Dannhusen

Nordic Commercial Manager

Thrombosis

Mobilnr: +46 70 780 00 34

Mail: PDASE@leo-pharma.com



● Advancing the care of patients with thrombosis

**Innohep®(tinzaparin)**. ATC-kod: Antikoagulantia (B01AB10). Injektionsvätska. Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Styrkor: 10 000 anti-Xa IE/ml samt 20 000 anti-Xa IE/ml, i förfyllda injektionssprutor samt injektionsflaskor.

Indikationer: SmPC 20 000 anti-Xa IE/ml: Behandling av djup ventrombos och lungemboli hos vuxna när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell. Förlängd behandling av venös tromboembolism samt prevention av återfall hos vuxna patienter med aktiv cancer. SmPC 10 000 anti-Xa IE/ml: Trombosprofylax vid kirurgi, speciellt vid ortopedisk, allmän eller onkologisk kirurgi hos vuxna. Trombosprofylax vid immobilisering på grund av akut medicinsk sjukdom såsom: akut hjärtsvikt, akut andningssvikt, allvarliga infektioner, aktiv cancer, samt försämringsepisoder av reumatiska sjukdomar hos vuxna. Trombosprofylax - antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation av blod under hemodialys och hemofiltration hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktuell eller anamnes på immunmedierad heparin-inducerad trombo-cytopeni (typ II). Allvarlig blödning eller tillstånd som predisponerar för allvarlig blödning, d.v.s. a) uppkommer på kritiskt område eller organ (ex. intrakraniellt, intraspinalt, intraokulärt, retroperitonealt, intraartikulärt eller perikardiellt, intrauterint eller intramuskulärt med kompartmentsyndrom), b) orsakar en minskning av hemoglobinnivå på 20 g/L (1,24 mmol/L) eller mer, eller c) leder till transfusion av två eller fler enheter av blod eller röda blodceller. Svår koagulations-rubbning. Akut gastroduodenalt ulcus. Septisk endokardit. Innohep injektionsvätska i injektionsflaska innehåller 10 mg/ml av konserveringsmedlet bensylalkohol. Det får ej ges till prematura barn och nyfödda med anledning av risken för "Gaspings syndrome". Behandlingsdoser av Innohep (175 IE/kg) är kontraindicerat hos patienter som erhåller neuroaxial anestesi. Om neuroaxial anestesi planeras ska Innohep avbrytas minst 24 timmar innan proceduren utförs. Innohep ska inte återinsättas före minst 4-6 timmar efter användningen av spinal anestesi alternativt efter att katetern avlägsnats. För fullständig produktinformation, sortiment och priser se [www.fass.se](http://www.fass.se). Datum för översyn av produktresumén för Innohep 10 000 anti-Xa IE/ml: 2021-03-08, för Innohep 20 000 anti-Xa IE/ml: 2021-05-12. REF-20927