

# Aktuella vaccin och vaccinval mot covid-19

Namn	Comirnaty 10 µg/dos mRNA	Comirnaty BA.4/BA.5 15/15 µg/dos mRNA	Spikevax BA.4/BA.5 0,1 mg/ml mRNA	Nuvaxovid Proteinbaserat
Vaccintyp	Ursprungsvaccin	Anpassat vaccin	Anpassat vaccin	Ursprungsvaccin
Indikation	Primärvaccin/ Påfyllnadsdos	Primärvaccin/ Påfyllnadsdos	Primärvaccin/ Påfyllnadsdos	Primärvaccin/ Påfyllnadsdos
Ålder	5-11 år	Från 12 år	Från 31 år	Från 31 år
Dosmängd	0,2 ml	0,3 ml	0,5 ml	0,5 ml
Intervall mellan dos 1 och 2	3-7 veckor	3-7 veckor	4-7 veckor	3-7 veckor
Godkänt för gravida?	✓	✓	✓	✗
Samvaccination	Alla över 18 år kan få mRNA-vaccin och vaccin mot influensa (standarddos/förstärkt) eller pneumokockvaccin vid samma tillfälle. Att ge fler än ett vaccin utöver covidvaccin samtidigt rekommenderas inte. Om samvaccination inte görs ska det gå minst 7 dagar mellan vaccinationerna.			Samvaccination med standarddosvaccin mot influensa eller pneumokocker ok – övriga vaccin minst 7 dagars intervall